

TABULKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU - KÁCENÍ DŘEVIN

Inv. číslo	Název dřeviny latinsky česky	Zast. druhů (%)	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Obvod náhradního kmene (cm)	Výška dřeviny x porostu (m)	Báze koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výměra porostu m ²	Index překryvnosti	Vitalita	Zdravot. stav	Úbytek koruny (%)	Sadov. hodnota	Finanční hodnota (Kč)	Poznámka
4	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá		97/83	31/26	127	8,5	1,5	7,5			2	2	20	3-4	89 382	větvení od země - lehce tlakové, lehké poškození báze
6	<i>Rosa canina</i> - růže šípková <i>Malus sp.</i> - jabloň <i>Acer platanoides</i> - javor mléč <i>Fraxinus excelsior</i> - jasan ztepilý	85 10 + +				2-5	0-1		54	1,5					10 064	dvě malé skupinky a jedná velká, celkem 141m2, kácí se jen část
7	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá <i>Fraxinus ornus</i> - jasan zimnář	70 30				5-6	1		10	1,3					717	3 mladší jedinci - vícekmenný od země + špatně založené koruny (asi kdysi řez), celkem 29m3, kácí se jen část
10	<i>Juglans regia</i> - ořešák královský		81/69/75/ 60/50	26/24/22/ 19/16	103	7	1,5	11			2	3	10	4-5	58 680	dva kmenný - hodně tlakové větvení - hrozí rozlomení, dále se větví na troják v 1m a dvoják v 0,7m (asi kdysi řez), obnažené dřevo+trouchnivý, lehce jednostranná koruna směrem ke smrkům
13	<i>Syringa vulgaris</i> - šedík obecný <i>Juglans regia</i> - ořešák královský <i>Prunus domestica</i> - slivoň špendlík <i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát <i>Prunus avium</i> - třešeň ptačí <i>Rubus sp.</i> - ostružiník	30 25 20 15 5 +				2-6	0-1		57	1,7					12 258	ideálně odstranit akáty, plocha 226m2, cena počítána bez části akátů tzn. ze 192m2, kácí se jen část 57m2, kdy cena je počítána s ohledem na akáty z 48m2
FINANČNÍ HODNOTA DŘEVIN PODLEHAJÍCÍCH REŽIMU POVOLENÍ KÁCENÍ V KČ															171 101	